

Hiervoor dient het konijnenhok regelmatig uitgemest te worden en voorzien van schoon en droog strooisel. Dit is ook van belang voor de maden ziekte.

Indien uw konijn los zal lopen in huis, zorg er dan wel voor dat alle snoeren goed zijn weggewerkt. Een konijn kan ook gemakkelijk zindelijk gemaakt worden. Dan schaft u best een kattenbak aan.

Vaccinaties

Myxomatose en Viraal Haemorrhagic Disease (VHD/RHD), zijn 2 besmettelijke virusinfectie die vaak met dodelijke afloop eindigen. Deze virussen worden o.a. overgebracht door bloedzuigende insecten, zoals muggen en vlooien, die bij geïnfecteerde (wilde) konijnen bloed hebben gezogen.

Konijnen die buiten worden gehouden lopen daarom veel risico om besmet te raken.

Helaas zijn ook binnenshuis konijnen zeker niet veilig. Muggen komen immers ook in huis.

Gelukkig kunt u uw konijn tegen deze ziektes beschermen door hen jaarlijks goed te laten vaccineren.

Gezondheidsproblemen

- Maagdarmproblemen: Door een verkeerde verhouding van het voer kunnen konijnen problemen krijgen: verstoppingen of te zachte ontlasting. Ook indien u geen keutels in het hok vindt, neem dan contact op met uw dierenarts.

- Gebitsproblemen: Konijnen hebben doorgroeiende tanden en kiezen. Bij niet voldoende hooi eten, kan

uw konijn gebitsafwijkingen krijgen, die bestaan uit het scheef doorgroeien van de snijtanden en punten (haken) op de kiezen. Deze afwijkende tanden geven pijn, problemen met eten en infecties van de bek.

- Blaasstenen: Deze zien we regelmatig bij konijnen. Dit geeft pijn en bloed bij de urine. Blaasstenen worden veroorzaakt door een combinatie van voedingsfactoren, te weinig drinken en/of te weinig beweging.

- Maden ziekte: Als de ontlasting te zacht is, blijft die kleven aan de vacht. Daar kunnen vliegen hun eitjes in leggen. Controleer uw konijn tijdens de zomer dagelijks op maden. Maden kunnen grote huidwonden veroorzaken. Neem snel contact op met uw dierenarts indien u dit constateert.

- Tumoren: voedsters kunnen baarmoederkanker ontwikkelen. Daarom raden wij u sterk aan om haar te steriliseren vanaf 6 maanden oud.

- Agressie: Door hormonen kunnen konijnen (zowel voedsters als rammelaars) agressief gedrag vertonen naar elkaar. Om dit te voorkomen raden we castratie of sterilisatie aan.

- Stoppen met eten: Er zijn verschillende onderliggende oorzaken waarom een konijn niet meer eet: verkeerd dieet, gebitsproblemen, haarballen, pijn, ...

Indien uw konijn niet meer eet dan raden wij u sterk aan om binnen de 24 uur contact op te nemen met uw dierenarts! Niet eten kan een dodelijke gasbuik veroorzaken!

Zorgen voor uw konijn



Ulicotenseweg 32

4861 RT Chaam

Tel: 0161-496016

@:info@dierenkliniekhetleijdal.nl



Konijnen zijn intelligente, vriendelijke en stille huisdieren. Ze leven gemiddeld 7 tot 10 jaar. Deze informatie zal u helpen om zo goed mogelijk voor hem of haar te zorgen.

Een voedster (vrouwje) of rammelaar (mannetje)

Een konijn is een sociaal dier en gewend om in een groep te leven. Daarom adviseren we om twee konijnen samen te nemen. De beste keus is een voedster en een rammelaar samen. Bij deze combinatie is het natuurlijk belangrijk om ongewenste nestjes te voorkomen. Konijnen zijn vruchtbaar vanaf 3-4 maanden. Om ongewenste nakomelingen te voorkomen raden we aan om de dieren vanaf die tijd apart te huisvesten en zo snel mogelijk te laten steriliseren/castreren. Een rammelaar kan gecastreerd worden vanaf een leeftijd van 4 maanden. Een voedster kan gesteriliseerd worden vanaf 6 maanden.

Voeding

De voeding is een heel belangrijk onderdeel van de verzorging van uw nieuw konijn. Met de juiste voeding worden problemen aan het maag-darm kanaal, de blaas en het gebit zoveel mogelijk voorkomen. Dit zijn de algemene adviezen:

- Onbeperkt hooi van een goede kwaliteit. Dit is het belangrijkste onderdeel van gezonde voeding. De vezels in het hooi zijn heel belangrijk voor een goede vertering.

- Een beperkte hoeveelheid brokjes: een volwassen konijn: 20-25gram korrels per kg lichaamsgewicht per dag, een konijn jonger dan 6 maand mag meer krijgen. Te veel brokken geven kan leiden tot obesitas, diarree en orgaan problemen.

Geef daarbij het liefst puur geperste korrels/pellets in plaats van gemende brokjes om zo te voorkomen dat het konijn enkel de lekkerste stukjes eruit eet.

- Groente: Dit moet dagelijks gegeven worden. Als u een jong konijn groente geeft moet dit opgebouwd worden. Start met een klein stukje groene bladgroente en voeg elke 5-7 dagen een nieuwe groente toe. Als de nieuwe groente na 24-48 uur tot diarree of zachte keutels leidt, dan kan die groente (nog) niet verdragen worden.

Wat kan je geven: groene bladgroenten, onkruid, kruiden en eetbare takken. Vermijd wortelgroenten. De volledige lijst van aanbevolen groenten kun je vinden in het informatieblad: "voeding van het konijn"

- Fruit: Het beste is om fruit helemaal te vermijden. Het is erg rijk aan enkelvoudige suikers en kan leiden tot maagdarmstoornissen en gebitsproblemen. Indien je toch iets wil geven, dan enkel in hele kleine hoeveelheden, bijv. 1 aardbei of 1 kers per dag. Ook hier raden we aan om geleidelijk op te bouwen.

Water

Water moet altijd beschikbaar zijn. Als een konijn 24 uur niets te drinken heeft, dan komt hij in de

problemen omdat er vochttekort ontstaat. Door vochttekort kan een konijn ook stoppen met eten. Hierdoor komt het dier in een razendsnelle cirkel omlaag. Zorg er dus altijd voor dat de waterbak of waterfles dagelijks gevuld wordt met fris, schoon water. In oud water ontstaat bacteriegroei, waardoor een konijn ziek kan worden.

Nachtkeutels of Caecotrofen

Deze worden vooral 's nachts geproduceerd. Nachtkeutels zien er anders uit dan normale keutels: ze zijn donkerder, kleiner en vochtiger, ze zijn bedekt door een slijm laag en ruiken sterker. Ze bevatten hoge gehalten aan vit B en K met tweemaal zoveel proteïnes en de helft minder vezels als de harde keutels. Het konijn eet deze zachte keutels op en zo wordt de voeding tweemaal verteerd gedurende 24uur. Deze nachtkeutels zijn een essentieel deel van het dieet van uw konijn.

Huisvesting

Konijnen houden van ruimte! Hoe groter, hoe beter. De minimale formaten voor een hok kunt u als volgt te weten komen: het konijn moet in de lengte languit kunnen liggen en in de breedte 5 keer kunnen zitten, in de hoogte moet het konijn op zijn achterpoten overeind kunnen staan. Het is natuurlijk beter als het een groter hok is! En het liefst met een verdieping. U moet er vooral op letten dat er genoeg ventilatie is, en dat het niet tocht, om o.a. luchtwegproblemen te voorkomen. Zorg voor een schone droge omgeving.